

FICHA TECNICA**Acronis®**

tiofanato metílico + pyraclostrobin
Fungicida + Fungicida / Suspensión Concentrada

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**INGREDIENTES ACTIVOS:**

Tiofanato metílico: Dimetil 4,4'-(o-fenileno) bis (3-tioalofanato). (Equivalente a 450 g de i.a./L.a 20°C)		% EN PESO 36.90%
---	-------	-----------------------------------

Pyraclostrobin: Metil {2-[1-(4-clorofenil)- pirazol-3-iloimetil] fenil} (metoxi) carbamato. (Equivalente a 50 g de i.a./L. a 20°C)		4.10 %
---	-------	---------------

INGREDIENTES INERTES:

Colorante, dispersante, anticongelante, emulsificantes, antiespumante, bactericida, espesante y solvente o vehículo.....		59.00 %
TOTAL:		100.00 %

Reg: RSCO-MEZC-1301Y-301-064-041

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:**BASF MEXICANA S.A. DE C.V.**

AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, MÉXICO, D.F.
TEL: 01 (55) 5325-2600

“HECHO EN FRANCIA”

“INSTRUCCIONES DE USO”

Acronis® es un fungicida con acción protectora y curativa; inhibe la germinación de la espora y controla el crecimiento del micelio y la esporulación. Su aplicación se realiza tratando la semilla antes de la siembra, proporciona protección durante la germinación y la primera etapa de desarrollo del cultivo.

CULTIVO	Enfermedad	DOSIS ml / 100 kg de semilla	OBSERVACIONES
Maíz (sin límite)	Pudrición de raíz <i>Fusarium sp.</i>	100 – 200	Se recomienda tratar la semilla de maíz antes de la siembra. El producto debe diluirse en 500 ml de agua para asegurar la buena impregnación para 100 kg de semilla.
Trigo Cebada Centeno Avena (sin límite)	Pudrición de raíz <i>Fusarium spp.</i> <i>Rhizoctonia spp.</i>	100 – 300	Se recomienda tratar la semilla antes de la siembra. El producto debe diluirse con un volumen de aplicación de 1-2 L de agua /100 kg de semilla.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

El tiempo de reentrada a las áreas de siembra es inmediatamente.

Método para preparar y aplicar el producto.

Recomendamos agitar el producto de forma previa al tratamiento. El envase del producto debe abrirse cuidadosamente usando el equipo de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta.

Acronis® es una formulación que debe diluirse en agua suficiente para asegurar una buena impregnación de la semilla a tratar, el cual deberá efectuarse sólo con equipo adecuado y diseñado para este fin con el objeto de obtener una buena impregnación, cubrimiento uniforme y evitar daño a la semilla.

Contraindicaciones.

La semilla tratada deberá etiquetarse con la siguiente leyenda: “ESTA SEMILLA HA SIDO TRATADA CON FUNGICIDAS, NO USARSE COMO ALIMENTO, FORRAJE O PRODUCCIÓN DE ACEITE”.

Acronis® no debe aplicarse sin el equipo de protección personal necesario. No tratar mayor cantidad de semilla de la necesaria para la siembra, los sobrantes deberán germinarse para evitar su uso con fines alimenticios o forrajeros. Asegúrese que la semilla tratada quede completamente cubierta al momento de la siembra.

Acronis® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Incompatibilidad.

No mezclar **Acronis** con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar, se hará con productos registrados en los cultivos aquí indicados; sin embargo es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.



The Chemical Company

“Manejo de Resistencia”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.