



La élite de los antibióticos.

Uso: Bactericida

Ingrediente(s) Activo(s): Gentamicina + Oxitetraciclina

Concentración: 10% + 30% /100 + 300 g de i.a.

Formulación: Polvo Humectable

Registro COFEPRIS: RSCO-MEZC-1323-302-002-040

¿Qué puede hacer por mí AGRY-GENT PLUS 5000?

- Alta concentración, menor dosificación, misma eficacia.
- Doble poder, para una mejor protección a tu cultivo.
- Vive tres experiencias con un solo producto: sistémico, preventivo y curativo.
- Es seguro y puede aplicarse en cualquier etapa de desarrollo de la planta.
- Obtén el mayor provecho del producto, pues no se degrada por altas temperaturas en el campo.
- No debes preocuparte, es ideal para el manejo de la Resistencia.
- Respaldo y experiencia con el respaldo y tecnología de Summit Agro en colaboración con nuestros socios comerciales y canal de distribución; sea parte de la experiencia del asesoramiento técnico profesional.

¿Porque debo usar AGRY-GENT PLUS 5000?

Es un antibiótico de amplio espectro para el control preventivo y curativo de una amplia gama de bacterias que infestan los cultivos agrícolas. Los ingredientes activos son: Sulfato de Gentamicina al 10% + Clorhidrato de Oxitetraciclina al 30%. El sulfato de Gentamicina con su acción multisitio inhibe la síntesis de proteínas uniéndose irreversiblemente al ribosoma bacteriano, el Clorhidrato de Oxitetraciclina tiene un efecto sinérgico bacteriostático.

El mejor costo-beneficio del mercado.

La innovadora formulación de Agry-Gent (bactericida ampliamente reconocido y efectivo) te ofrece los mismos resultados con una formulación superior, tiene mayor concentración por gramo de ingrediente activo.

Único con presencia en 17 países.

Con mas de 25 años en el mercado internacional nuestro producto tiene presencia en 17 países con la misma eficacia y control que ya conoce.

Menos es más.

Un sobre de 160 gr / Ha tiene la misma eficacia que una bolsa de 800 gr de otros bactericidas en el mercado. No aplique cantidades, aplique garantía y calidad.

Tabla de uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Papa	<i>Erwinia atrosepica</i>	320 g/400 L de agua	28 días	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	
Papa	<i>Pseudomonas solanacearum</i> E.F. Smith	320 g/400 L de agua	28 días	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	
Peral	<i>Erwinia amylovora</i>	800 g/1000 L de agua	21 días	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	
Calabacita	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha
Pepino	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha
Melón	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Calabaza	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha
Sandía	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha
Chayote	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha
Chilacayote	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha
Jitomate	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 550 - 650 L de agua /ha
Berenjena	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 550 - 650 L de agua /ha

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Chile	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 550 - 650 L de agua /ha
Pimiento	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 550 - 650 L de agua /ha
Tomate de cáscara	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 550 - 650 L de agua /ha
Papa	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 550 - 650 L de agua /ha
Cebolla	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>axonopodis</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha
Ajo	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>axonopodis</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Porro/Puerro	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>axonopodis</i>	160 - 320 g/ha	Sin Límite	Después de haber transcurrido 24 horas de aplicado el producto.	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación de 400 - 500 L de agua /ha

Recomendaciones de uso

Tiempo de reentrada a la zona: Después de 24 horas

Úsese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados

¡Siempre calibre su equipo de aplicación!

Métodos para preparar y aplicar el producto

Abra el envase cuidadosamente por la parte superior y mida la cantidad de producto indicado, mezcle en el tanque aspersor con la mitad de agua recomendada, luego agregue la otra mitad del agua agite la mezcla constantemente, para aumentar la penetración del producto agregue un penetrante en la mezcla, aplique con aspersora terrestre (de mochila o de tractor) cubriendo todo el follaje a punto de goteo.

Contraindicaciones

No aplicar cuando exista viento fuerte (más de 15 km/hr).

Fitotoxicidad

Agry-Gent® 5000 no presenta ningún grado de fitotoxicidad en los cultivos recomendados y a las dosis indicadas.

Incompatibilidad

No mezcle AgryGent® 5000 con caldo bordelés y otros productos de reacción alcalina. Cuando se requiera realizar mezclas éstas solo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

Manejo de Resistencia

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las

frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Garantía

QUÍMICA AGRONOMICA DE MÉXICO, S DE R. L. DE C.V. Solo responde de la formulación correcta y el contenido neto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables del uso y resultados del producto. En caso de exportación de los agrícolas tratados con este agroquímico el usuario debería cerciorarse sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a: cultivos autorizados, tolerancias, tiempos de espera y residuos.

Titular del registro

DISTRIBUIDOR: SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V. Rubén Darío No. 281 - 1902 Col. Bosques de Chapultepec C.P. 11580 México, D.F. Tel. (55) 5279-4340
www.summitagromexico.com.mx TITULAR DEL REGISTRO: QUIMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. Calle 18 No. 20501, Esquina Innovación Col. Impulso, C.P. 31183 Chihuahua, Chih. México. Tel. (614) 483-9000 Fax. (614) 483-9000



SUMMIT AGRO
MÉXICO