



Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



BOSCATRID

Boscalid

Fungicida

Líquido dispersable en agua

Carboxamida

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-FUNG-0301V-X0330-420-50.0

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

BOSCALID.

2-cloro-N-(4'-clorobifenil-2-il)nicotinamida
(Equivalente 380 ML de i.a./Kg)

50.0

Ingredientes Inertes.

Agente dispersante, agente humectante, relleno, agente anticorrosivo y agente disgregador

50.0

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

Es un fungicida sistémico con actividad translaminar que inhibe la germinación de las esporas e impide la formación del tubo germinativo y la formación de apresorios, en algunos hongos tiene efectos sobre el crecimiento micelial y el desarrollo de las esporas.

REG_FT_DIS_018

Versión. 00

Fecha de elaboración. 12.JUL.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo que sean resistentes a polvos, respirador con filtro para polvo (tipo P100), lentes de seguridad y careta, capucha de ala ancha o gorra repelente a líquidos, guantes de nitrilo o neopreno preferentemente, botas de neopreno de caña alta y suela gruesa y delantal impermeable.

Al finalizar la jornada laboral, el trabajador deberá quitarse el equipo de protección personal para que sea lavado y almacenado en el centro de trabajo. La ropa de uso para trabajo deberá lavarse por separado del equipo de protección personal y de la ropa de uso común para evitar su contaminación. El trabajador, después de aplicar o manipular el producto, deberá bañarse y ponerse ropa limpia de uso diario. Bajo ninguna circunstancia, el trabajador deberá llevar la ropa de uso para trabajo ni el equipo de protección personal a su casa.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS ml/ha	OBSERVACIONES
PAPA (10) JITOMATE (0) TOMATE VERDE (0) PIMIENTO MORRÓN / JALAPEÑO (0)	TIZÓN TARDÍO (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.80	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. (0 días)

(-) Intervalos entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo.

TIEMPO DE REENTRADA.

24 horas después de la aplicación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección puesto indicado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” que aparece en el lado izquierdo de esta etiqueta, retire la tapa y el sello de seguridad para abrir el envase.

Llene el tanque de mezcla con la mitad del agua a utilizar, incorpore la dosis previamente pesada con ayuda de una balanza de precisión y adicione el agua faltante; agite hasta lograr una completa homogenización. Aplique con un equipo de aspersión terrestre convencional, mantenga la mezcla en constante agitación durante su aplicación, cubra por completo el follaje del cultivo. La mezcla se deberá aplicar el mismo día de su preparación.

CONTRAINDICACIONES.

No use el producto de modo diferente a lo recomendado en esta etiqueta. No aplique el producto: en plantas estresadas por riegos inadecuados, con temperaturas extremas o en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva. No aplicar en contra del viento.

INCOMPATIBILIDAD.

BOSCATRID no debe mezclarse con ningún otro plaguicida. Sin embargo, en caso de ser necesario, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad. Las mezclas que se realicen deberán ser con productos registrados para los cultivos aquí indicados.





Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

