

¡ALTO LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

GRUINDAG® CITROX 10 SL

DESINFECTANTE ORGÁNICO - BACTERICIDA - FUNGICIDA

DESINFECTANTE ORGÁNICO

ACIDO CITRICO 10.0%

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD a 1.12 gr/mL

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE
INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LOS OJOS Y LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACIÓN.
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCION: GRUINDAG® CITROX es una formulación basada en ácido cítrico que ha demostrado tener amplio espectro de actividad contra los microorganismos que atacan nuestra agricultura, pertenece a una nueva generación de fungicidas orgánicos, no dañino, ecológico y no tóxico al hombre ni a los animales.

GRUINDAG® CITROX es efectivo en la desinfección de semillas, en el control de hongos en los almácigos y en el control de hongos que atacan a las hojas y flores.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Durante el uso y manejo use el equipo de protección consistente en botas de hule, mascarilla, anteojos protectores, guantes y overol para el manejo y aplicación de este producto. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento y calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que está aplicando la dosis correcta. Este puede ser aplicado con cualquier tipo de boquilla y equipo de aplicación aéreo o terrestre.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Al preparar la mezcla, llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis completa que va a utilizar y mézclate; posteriormente complete el agua a utilizar. Si mezclas con otros plaguicidas haga premezclas por separado y luego vierta al tanque las mezclas. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de la aspersora. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación, báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS
Cítricos	Podredumbre gris <u>Penicillium</u> spp.	Aplicar de 300 ml. a 500 ml. / Ha cada 15 a 20 días tan pronto aparezcan los primeros ataques de Botrytis o Penicillium.
	<u>Botrytis</u> sp.	
Papa <u>Solanum</u> <u>tuberosum</u>	Tizon tardío <u>Phytophthora infestans</u>	Aplicar de 300 ml. a 500 ml. / Ha tan pronto se vean las primeras manchas en las hojas.

Tomate <u>Lycopersicum</u> <u>esculentum</u>	Tizon tardío <u>Phytophthora infestans</u>	Aplicar de 300 ml. a 500 ml. / Ha tan pronto se vean las primeras manchas en las hojas.
Banano <u>Musa</u> sp.	Sigatoka negra <u>Mycosphaerella fijiensis</u>	Aplicar de 300 ml. a 500 ml. / Ha tan pronto se vean las primeras manchas en las hojas.
	Punta de cigarro <u>Stachylium</u> sp. Hongos que producen pudrición de corona <u>Colletotrichum musae</u> <u>Botryodiplodia</u> <u>theobromae</u> <u>Fusarium roseum</u> <u>Verticillium theobromae</u>	Para control en postcosecha de hongos y bacterias se recomienda de 5 a 10 ml/litro de agua.
Ají <u>Capsicum</u> <u>annuum</u>	Cenicilla <u>Leveillula taurica</u>	Aplicar de 300 ml. a 500 ml. / Ha tan pronto se vean las primeras manchas en las hojas.
Sandia <u>Citrullus</u> <u>Lanatus</u>	Mildiu <u>Pseudonospora</u> <u>cubensis</u>	0.5 ml. /Lt de agua cada 10 días

INTERVALO DE APLICACIÓN: Cada 12 o 15 días durante el ciclo del cultivo dependiendo de la presión de las plagas.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No hay restricciones.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Se puede ingresar al área tratada en cuanto se seque la solución aplicada. en caso de mezclas, guardar la recomendación dada para los otros productos.

FITOTOXIDAD: GRUINDAG® CITROX, no es Fitotóxico a las dosis e indicaciones recomendadas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros pesticidas a excepción de los alcalinos.

PRECAUCION Y ADVERTENCIA DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Los materiales adecuados para el manejo y almacenamiento del GRUINDAG® CITROX son: Polipropileno, Polietileno de baja densidad y acero inoxidable. GRUINDAG® CITROX se debe manejar con las consideraciones propias para los productos químicos. El personal deberá utilizar goggles, guantes, ropa y zapatos de seguridad, evitando comer, beber y/o fumar durante el manejo del producto.

Este producto no es inflamable ni corrosivo. No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de chispas y de llamas, lejos del alcance de niños, personas discapacitadas, y animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASA DE HABITACIÓN
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑARSE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA



SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Se presenta enrojecimiento de los ojos y alergias en la piel, irritación de las mucosas nasales, mareos y dolor de cabeza.

PRIMEROS AUXILIOS:

Por ingestión: Si la persona está consciente, administre repetidamente carbón activado disuelto en grandes cantidades de agua.

Por inhalación: Retire a la persona afectada de la zona de peligro y llévela a una habitación bien ventilada o a donde haya aire fresco y protéjala de la hipotermia. Contacte a un medico inmediatamente.

Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lave completamente las partes del cuerpo afectadas con agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas.

Por contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua limpia durante varios minutos y llame inmediatamente a un medico.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital
Dr. Luis E. Aybar.(Morgan)
Tel: (809) 684-3478

Hospital
Dr. Francisco Moscoso Puello
Tel: (809) 681-2913

MEDIDA PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenajes, alcantarillas, etc. Evite los derrames de producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan al arrastre del producto hacia otras áreas.

• NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES VACIOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el ministerio de salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTIA

El fabricante garantiza que el contenido de este envase esta acorde con la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con su uso, el fabricante no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FORMULADO POR:

Guindag International SA de CV



Allende s/n. Lote 2, Manzana 13. Parque Industrial Cuautla. Ayala Morelos, México. CP 62700

IMPORTADO POR:

Jareca Agroindustrial, S.R.L., Av. Duarte #70, Villa Bisonó, Navarrete, Santiago, Rep. Dominicana



PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA		