

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Las cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado, completo, necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, guantes o lentes tipo quimbo, guantes y botas de neopreno). Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a lavar del viento, evitando derrames. No coma, beba o fume durante las aplicaciones. Después de sus labores, lávese cuidadosamente y pongase ropa limpia. No use la ropa de trabajo sin antes lavarla bien.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONES.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGERA, INHALE, ENTUSE O CONTOQUE CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES. USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESAJE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Consiga atención médica inmediata, mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si hay salpicadura a los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua corriente limpia. Si se derramó sobre la piel, lávese cuidadosamente con abundante agua y jabón y quítense la ropa contaminada. Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito ni trate de introducir nada por la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo Químico: Insecticida.

Signos y síntomas de intoxicación: En caso de contacto con la piel o ojos se puede presentar irritación ligera y moderada. En caso de ingestión se puede presentar náusea en boca y garganta. En caso de inhalación se puede presentar irritación en nariz, tos y flujo nasal. **Tratamiento y antidoto:** No existe antidoto específico, dar tratamiento sintomático y de sostén al paciente.

MEIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LANARLO O DERRAMARLO EN ELLOS NI EN LOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O EN SUS ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CON CUIDADO. A LO DEMOSTRADO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGISTRO Y AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTES LA SEMANA.
- EL USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, ENTRE OTROS, AL CERCAR LOS POZOS DE AGUA Y NO EL AGUA QUE EN FONDO EL NIVEL DE LOS MANANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (7.50 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE, PARA EVITAR TERNER O ARQUELAR, COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACUMULO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.
- REFIJE EL FUMIGADOR DEL ENVASE VACÍO Y VIENTA EL AGUA DE ENRIQUECIMIENTO EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREENE LA MEZCLA DE APLICACIÓN.
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABELAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABELAS SE ENCUENTRAN LIBERANDO.
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ALGUNOS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS.

ETIQUETA DE DOBLE VUELTA USO AGRÍCOLA



Clotianidín

Insecticida / Suspensión concentrada

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Clotianidín: (E)-1-(2-Cloro-1,3-bis(2-5-imidil)-3-metil-2-nitroguanidina (Ecuivalente a 257 g de I.A.L. a 25°C)

INGREDIENTES INERTES:

Portador, espesantes, estabilizador de dispersión, humectantes, dispersante, antisepante, conservador.

REG. RSCO-INAC-9103K-0434-008-23-60



21 05 29
206900593235

Nocivo si se inhala

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo por el contacto con la piel

Título del Registro e Importador:
VALENT DE MEXICO S.A. DE C.V.
Av. Vallarta 4550, C.P. 45010
Zapopan, Jalisco, C.P. 45010
Tel. (33) 3110 0762

HECHO EN USA

PRECAUCIÓN

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS.

INSTRUCCIONES DE USO.
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL:

CLUTCH SC es un insecticida formulado como suspensión concentrada, para el control de la plaga en los cultivos que se indican a continuación.

Cuadro de recomendaciones: Consulte la información dentro de la etiqueta.

TIEMPO DE REENTRADA AL ÁREA TRATADA:

24 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Utilizando el equipo de seguridad agite vigorosamente la botella del producto antes de abrirlo, ejerciendo presión en la tapa que para abrir en sentido contrario de las manecillas del reloj, utilice de preferencia una probeta graduada o equipo más exacto para medir la dosis a utilizar. Hacer una premexa con la cantidad a usar de CLUTCH SC, vertida en el tanque de aspersión, llenando previamente hasta la mitad, agitar la mezcla continuamente y llenar hasta la capacidad total del tanque. La agitación debe ser continua durante la aspersión al cultivo.

CONTRINDICACIONES:

No aplique si existe amenaza de lluvia. Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/h).

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda su uso con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación, evite el uso repetido de este producto alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

FITOTOXICIDAD: CLUTCH SC no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se aplicó a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

GARANTÍA:

Son precepto de lo que establece la Ley Federal de Protección al Ambiente, VALENT DE MEXICO S.A. DE C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta en su envase original y sellado y no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto por ser operaciones fuera de su control.





ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS
Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS.

INSTRUCCIONES DE USO.
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL:
CLUTCH SC es un insecticida formulado como suspensión concentrada, para el control de la plaga en los cultivos que se indican a continuación.

TIEMPO DE REENTRADA AL ÁREA TRATADA:
24 horas después de la aplicación.

CULTIVO	PLAGAS	DOSES L/ha	RECOMENDACIONES
CAJABACIA, CALABAZA, MELÓN, PEPINO, SANDÍA (21) (7)	Mosca blanca / <i>Bemisia tabaci</i> Pulgón / <i>Aphis gossypii</i>	0,7 - 0,9 0,3 - 0,45	Aplicación al suelo en "drench" o vía sistema de riego por goteo; realizar una aplicación al cuello de la planta, tres días después de la emergencia; es necesario que exista suficiente humedad en el suelo al momento de la aplicación. La aplicación en "drench" debe realizarse con mochila manual adaptada con una lanza inyectora liberando 20 ml de solución del producto en cada planta. Aplicación foliar: realizar 2 aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días; iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. Para realizar las aplicaciones foliares se recomienda el uso de una mochila convencional calibrada a un gasto de 400 l/ha de agua/ha. Aplicación al suelo: Realizar una aplicación al suelo alrededor del árbol, ya sea en drench o vía sistema de riego por goteo; iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. Es necesario que exista suficiente humedad en el suelo al momento de la aplicación. La aplicación en "drench" debe realizarse con mochila manual adaptada con una lanza inyectora liberando 1500 ml de solución /planta. Para realizar las aplicaciones foliares se recomiendan el uso de una mochila convencional calibrada a un gasto de 1000 L de agua/ha.
MANZANO PERAL (14)	Pulgón / <i>Eriosoma lanigerum</i>	0,3 - 0,7 0,6 - 1,0	Aplicación foliar: Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días; iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. Aplicación al suelo: Realizar 2 aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días; iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. Para realizar las aplicaciones foliares se recomiendan el uso de una mochila convencional calibrada a un gasto de 600 L de agua/ha. Se recomienda el uso de una mochila convencional calibrada a un gasto de 600 L de agua/ha.
ROSAL (SU) (14)	Mosca Blanca / <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0,4 - 0,6	Aplicación foliar: realizar 2 aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días; Se recomienda empezar las aplicaciones cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Se recomienda el uso de una mochila convencional calibrada a un gasto de 600 L de agua/ha.
VID (14)	Mosca blanca / <i>Bemisia tabaci</i> Pepo Harinoso / <i>Planococcus ficus</i>	0,6 - 1,0 0,2 - 0,6	Realizar una aplicación al cuello de la planta, en "drench" o vía sistema de riego; iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos, es necesario que exista suficiente humedad en el suelo al momento de la aplicación. La aplicación en "drench" debe realizarse con mochila manual adaptada con una lanza inyectora liberando 300 ml de solución del producto en cada planta. Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días; iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. Para realizar las aplicaciones foliares se recomiendan el uso de una mochila convencional calibrada a un gasto de 600 L de agua/ha.
PAPA (14) (7)	Pulgón salador / <i>Bactericera cockerelli</i> Pulgón / <i>Myzus persicae</i> Mosca blanca / <i>Bemisia tabaci</i> Pulgón salador / <i>Bactericera cockerelli</i>	0,5 - 0,9 0,3 - 0,45 0,4 - 0,75 0,4 - 0,75	Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de la siembra. Volumen de aplicación: 1000 L/ha Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días. Volumen de aplicación: 400 L/ha Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 150-250 L de agua/ha. Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 150-250 L de agua/ha. Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 150-250 L de agua/ha.
BEBENENA, FRUTILLA, FRUTALES, CASCABA (14) CHILE BELLA (17) (4)	Mosca blanca / <i>Bemisia tabaci</i> Pulgón salador / <i>Bactericera cockerelli</i>	0,3 - 0,45 0,2 - 0,9	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días. Volumen de aplicación: 400 L/ha. Aplicar en drench al cuello de la planta 3 días después del trasplante. Volumen de aplicación: 20 ml de solución/planta.
CHILE (10), PIMENTÓN (10)	Picudo del chile / <i>Anthonomus eugenii</i>	0,6 - 0,75	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 150-250 L de agua/ha.
NOGAL (21)	Pulgón amarillo / <i>Monellia caryella</i>	0,36 - 0,5	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 15 días. Volumen de aplicación: 1200 L/ha. Período de protección: 7 días después de la segunda aplicación.
SORGO (7)	Pulgón amarillo / <i>Metanaphis sacchari</i>	0,1 - 0,75	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 14 días, cuando se detecten los primeros insectos. Volumen de aplicación: 770 a 870 L de agua/ha

PRECAUCIÓN

