

FICHA TECNICA

Convey®

topramezone

Herbicida / Suspensión Concentrada

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:		% EN PESO
Topramezone:		
[3-(4,5-dihidro- 1,2 oxazol -3-il)-4-mesil-o-tolil](5-hidroxi-1-metilpirazol-4-il) metanona.....		29.73 %
(Equivalente a 336 g i.a./L a 20°C)		
INGREDIENTES INERTES:		
Solvente (agua), anticongelante, dispersante, antiespumante y estabilizador.....		70.27 %
TOTAL:		100.00 %

Reg: RSCO-HEDE-0202C-301-064-030

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO

POR: BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975

COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES

C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO

TEL: 01 (55) 5325-2600

INSTRUCCIONES DE USO

Convey® es un producto que debe ser usado en postemergencia temprana de malezas para el control del complejo de malezas en el cultivo de maíz. **Convey®** es absorbido por el follaje de las plantas, se mueve a través del floema hacia los puntos de crecimiento, los primeros síntomas se manifiestan como detención del crecimiento y albinismo de las hojas. La muerte de las plantas ocurre entre los 15 y 20 días después de la aplicación.

Convey® es un herbicida que debe aplicarse en post-emergencia temprana al cultivo y maleza (1-3 hojas verdaderas o cuando tengan una altura de 3-5 cm).

Cultivo	Maleza	Dosis ml pc/ Ha	Observaciones
Maíz (45)	Zacate de agua <i>(Echinochloa colonum)</i> Zacate rayado <i>(Echinochloa crus-galli)</i> Zacate pata de gallo <i>(Eleusine indica)</i> Zacate de la pasión <i>(Eragrostis ciliaris)</i> Zacate navajita <i>(Chloris chloridea)</i> Zacate triguillo <i>(Brachiaria plantaginea)</i> Zacate gigantón <i>(Tithonia tubaeformis)</i> Zacate ceboso <i>(Leptochloa filiformis)</i> Verdolaga <i>(Portulaca oleracea)</i> Tripa de pollo <i>(Commelina diffusa)</i> Quelite o bledo <i>(Amaranthus hybridus)</i> Aceitilla <i>(Bidens pilosa)</i>	60-100	Para incrementar la efectividad biológica del producto, mezclar con atrazina a una dosis de 1500 g i.a./ Ha.

	Fresadilla (<i>Aldama dentata</i>) Chayotillo (<i>Sicyos deppei</i>) Campanita (<i>Ipomoea purpurea</i>) Hierba del pastor (<i>Acalypha indica</i>) Girasol (<i>Helianthus annuus</i>)		
--	---	--	--

() = Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 4 horas después de la aplicación o cuando haya secado el producto.

Método para preparar y aplicar el producto:

Preparación de la solución. Agregue agua limpia al tanque del equipo de aplicación aproximadamente a la mitad de su capacidad, posteriormente agregue la cantidad necesaria de **Convey®** y llene el tanque a su capacidad manteniendo una agitación constante. Se recomienda la adición de atrazina a una dosis de 1500 gr i a /ha para incrementar la acción biológica del mismo con un volumen de aplicación de 300-400 L de agua/ha.

Equipo de aplicación. Calibre el equipo de aplicación y asegúrese de que funcione adecuadamente. Utilice boquillas de abanico plano a una presión de 30-40 libras/pulgada cuadrada con un volumen estimado de descarga de 300-400 L de agua/ha.

Forma de aplicación. **Convey®** debe aplicarse con un volumen suficiente que garantice una buena cobertura (300 a 400 L/Ha). Aplique cuando la maleza se encuentre en etapa de activo crecimiento.

Contraindicaciones:

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No aplique cuando existan fuertes corrientes de viento (de más de 15 km/hora), ni en horas de intenso calor. **Convey®** no causa ningún efecto fitotóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados.

Incompatibilidad:

Convey® puede combinarse con herbicidas o coadyuvantes oficialmente autorizados en el cultivo de maíz.

“Manejo de Resistencia”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com