



Ethrel® 240

Regulador de crecimiento / Líquido

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

ETHEPHON

Composición porcentual:

Ingrediente activo:

% en peso

Ethephon: Acido 2 (cloroetil) fosfónico. NO MENOS DE.....21.70

No. de Registro:

RSCO-3056/VI/94

Sistemicidad:

Sistémico

Contacto

Translaminar

X

Descripción:

Regulador del crecimiento natural de las plantas que acelera la maduración y mejora la coloración y calidad de los frutos, incrementando el rendimiento de las cosechas de cereales (trigo, cebada y arroz), tomate, vid, manzano, café, piña, tabaco, zarzamora y caña de azúcar.

USOS

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Cerealies Cebada Arroz Trigo	Para evitar al "Acame" e incrementar el rendimiento.	1.5 – 2.0	Debe realizarse entre los 35 – 45 días después de la germinación.
Café	Para reducir el número de cortes.	2.0 – 3.0	Cuando se encuentre un 90 – 95 % de las "cerezas" maduras fisiológicamente.
Manzano	Para uniformizar la producción.	150 – 200 ml/ 100 L de agua	Aplicar tres semanas antes de la cosecha.
Piña	Para inducir floración.	2.0 – 4.0 + 20 - 40 g de urea	Aplicar cuando la planta haya alcanzado una madurez para soportar un fruto de tamaño comercial
Tabaco	Reducir el tiempo en el horno dando un tabaco más uniforme.	4.0 – 8.0	Aplicar después del segundo o tercer tallo cuando las hojas superiores hayan alcanzado una madurez fisiológica.

Productos Fitosanitarios

Tomate	Reducir número de cortes y acelerar la producción.	4.0 – 8.0	Aplicar cuando la mayor parte de la fruta haya llegado al tamaño comercial y se tenga de 5 – 15 % de frutos rojos o pintados.
Caña de azúcar	Para mejorar la calidad del azúcar en cosecha temprana.	3.0 – 4.0	8 – 12 semanas antes de la cosecha.
	Para la germinación de caña para “semilla”.	3.0 – 4.0	Aplicar tres semanas antes del corte. Siembre los tallos de “semilla” tan pronto como sea posible después del corte.
	Para aumentar el amacollamiento.	1.0 – 3.0	Cuando los retoños tengan una altura aproximada de 30 – 50 cm, (medidos desde el nivel del tallo hasta la parte inferior de la última hoja brotada).
	Para inhibir la floración.	2.0 – 3.0	Debe ser aplicado 1 a 2 semanas antes de la inducción de floración.
Vid	Uniformizar la cosecha y acelerar la maduración.	2.0 – 4.0	Aplicar cuando el 5 – 30 % de los frutos esté coloreado, dirigiendo la aplicación tanto a los racimos como al follaje.
Zarzamora	Madurador de cañas (ramas) y a su vez promover brotes laterales.	2.0 – 2.5 L/200 L de agua	Hacer dos aplicaciones, la primera debe de realizarse 2 semanas antes de la defoliación y la segunda aplicación debe realizarse una semana después de la primera aplicación

Tiempo de reentrada 24 horas

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 y 3.785 L