

MALATHION 1000 CE

Concentrado emulsionable

REGISTRO:
RSCO-INAC-0143-314-009-084

RIQUEZAS GARANTIZADAS	% EN PESO
Ingrediente activo: MALATION: Dietil (dimetoxifosfotioilto) succinato (Equivalente a 1000 g. de i. a./L.)	83.60
Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados.	16.40



PARA EL CONTROL DE:

Trips, chapulin, Mariposita amarilla, Picudo de la alfalfa, Chinche manchadora, Picudo egipcio, Pulgón manchado, Chinche manchadora, Conchuela café, Conchuela verde, Picudo de algodón, Pulgón de algodón, Grillo de campo, Gusano trozador, Pulgón de la espiga, pulgón del follaje, Pulga saltona, Chinche arlequín, Palomilla dorso de diamante, Pulgon de la col, Barrenador del fruto, Chicharrita, Gusano falso medidor, Pulgón verde, Barrenillo del chilén, Chicharrita, Pulga saltona, Grillo de campo, Minador de la hoja, Mosquita blanca, Trips, Pulgón, Chicharrita, Chinche ligus, Conchuela del frijol, Chicharrita, Pulgón, Grillo de campo, Chicharrita, Pulga saltona, Pulgón myzus, Chicharrita, Frailecillo, Trips, Picudo de la papa, Pulga saltona, Pulgón, Chinche de los cereales, Mosca pinta o salvazo, Barrenador de la piña, Chapulines, Chinche café del sorgo, Gusano talareño, Mosca midge, Pulgón del cogollo, Pulgon del follaje, Descarnador de la hoja, Pulgón, Trips, Agalla del aguacate, Barrenador de las ramas, Barrenador grande del hueso, Chinche de encaje, Mosca verde del aguacate, Palomilla del hueso, Periquito del aguacate, Escama roja de California, Escama roja de Florida, Gusano perro, Piojo harinoso, Mosca de la fruta, Pulgón negro, Pulgón del algodón, Escama púrpura, Trips, Chinche de encaje, Escama San José, Mosca de la fruta, Picudo de la guayaba, Escama del mango, Escama de San José, Frailecillo, Pulgón lanífero, pulgon verde del manzano, Palomilla de la manzana, Pulgón negro, Mosca de la papaya.

PRINCIPALES CULTIVOS:

Ajo, Cebolla, Algodonero, Avena, Cebada, Trigo, Brocoli, Col, Coliflor, Col de bruselas, Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Cártamo, Chícharo, Chile, Fresa, Frijol, Jitomate, Tomate de cáscara, Lechuga, Maiz, Papa, Pastizales, Piña, Sorgo, Vig, Aguacatero, Chabacano, Durazno, Guayabo, Mango, Manzano, Membrillo, Pera, Nogal, Pecanero, Papayo.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/HA)
Ajo (3) Cebolla (3)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	0.7 a 1.0
Alfalfa (S/L)	Chapulín (<i>Brachystola magna</i> , <i>Melanoplus sp</i>) Pulgón verde (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) Chicharrita (<i>Aceratagalliicurvata</i> , <i>Empoasca- brupta</i>) Mariposita amarilla (<i>Colias eurytheme</i>) Picudo egipcio (<i>Hypera brunneipennis</i>) Pulgón manchado (<i>Therioaphis maculata</i>) Picudo de la alfalfa (<i>Epicaerus aurifer</i>)	0.7 a 1.0
Algodonero (S/L)	Chinche manchadora (<i>Dysdercus sp</i>) Conchuela café (<i>Euschistus servus</i>) Conchuela verde (<i>Nezara viridula</i>) Picudo del algodón (<i>Anthonomus grandis</i>) Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>) Grillo de campo (<i>Acheta domesticus</i>) Gusano trozador (<i>Agrotis malefida</i> , <i>Agrotis ipsilon</i>)	1.0
Avena (7) Cebada (7), Trigo (7)	Pulgón de la espiga (<i>Macrosiphum avenae</i>) Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>)	0.7 a 1.0
Brocoli (3) Col (7) Coliflor (7) Col De Bruselas (7)	Pulga saltona (<i>Phyllotreta sp</i>) Chinche arlequín (<i>Murgantia histrionica</i>) Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>) Pulgon de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.7 a 1.0 0.75 a 1.0
Calabacita(3) Calabaza(3) Melón (1), Pepino (1)	Barrenador del fruto (<i>Diaphania nitidalis</i> , <i>Diaphania sp</i> , <i>Diaphania hyalinata</i>) Chicharrita (<i>Empoasca sp</i>) Diabrotica (<i>Diabrotica sp</i>)	0.5 a 1.0 0.5 a 1.0
Cártamo (21)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	1.0 a 1.5
Chícharo (3)	Pulgón verde (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) Chicharrita (<i>Empoasca sp</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp</i>)	0.5 a 1.0



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola®

innovacionagricola.com
01 800 248 8800



Chile (3)	Barrenillo del chile (<i>Anthonomus eugenii</i>)	1.5
	Chicharrita (<i>Eutettix tenellus</i>)	0.5 a 0.7
	Pulga Saltona (<i>Epitrix</i> sp., <i>Chaetocnema</i> sp.) Grillo de campo (<i>Acheta domesticus</i>) Minador de la Hoja (<i>Liriomyza</i> sp)	0.5 a 1.0
Fresa (3)	Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> sp) Trips (<i>Thrips</i> sp) Pulgón (<i>Pentatrichopus</i> sp)	1.0 a 1.5
Frijol (1)	Chicharrita (<i>Empoasca</i> sp.)	0.5 a 1.5
	Chinche ligus (<i>Lygus</i> sp) Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0
	Conchuela del frijol (<i>Epilachna varivestis</i>) Picudo del ejote (<i>Apion godmani</i>)	1.0 a 1.5
Jitomate (3) Tomate de Cáscara (1)	Chicharrita (<i>Eutettix tenellus</i>)	0.7 a 1.0
	Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>) Grillo de campo (<i>Acheta domesticus</i>)	0.5 a 1.0
	Chapulines (<i>Brachystola magna</i> , <i>Melanoplus</i> sp, <i>Sphenarium</i> sp) Chicharrita (<i>Dalbulus elimatus</i> , <i>Dalbulus maidis</i>), Frailecillo (<i>Macrodactylus mexicanus</i>)	0.5 a 1.0
Maíz (5)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Frankliniella williamsi</i>)	1.0
Lechuga (14)	Chicharrita (<i>Empoasca</i> sp) Pulga saltona (<i>Phyllotreta</i> sp), Pulgón myzus (<i>Myzus persicae</i>) Pulgón de la col (<i>brevicoryne brassicae</i>)	1.0
Papa (5)	Catarinita de la papa (<i>Leptinotarsa undecemlineata</i>) Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>) Picudo de la papa (<i>Epicaerus cognatus</i> , <i>Phyrdenus muriceus</i>)	1.0 a 1.5
	Pulga saltona (<i>Epitrix cucumeris</i>)	1.0
	Pulgón (<i>Macrosiphum solanitolii</i>)	1.0 a 1.5
Pastizales (S/L)	Chinche de los cereales (<i>Blissus leucopterus</i>)	1.0 a 1.5
	Mosca pinta o salivazo (Adulto) (<i>Aeneolomia postica</i> , <i>Prosapia simulans</i>)	1.5
Piña (7)	Barrenador de la piña (<i>Tecla basilides</i>)	1.0
Sorgo (7)	Chapulines (<i>Melanoplus</i> sp., <i>Sphenarium</i> sp, <i>Brachystola</i> sp)	0.5
	Chinche café del sorgo (<i>Oebalus mexicana</i>)	0.5
	Gusano talareño (<i>Nola sorghiella</i>)	0.5 a 1.0
	Mosca midge (<i>Contarinia sorghicola</i>)	1.0
	Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>) Pulgon del follaje (<i>schizaphis graminum</i>)	0.5 a 0.7
Vid (3)	Descarnador de la hoja (<i>Harrisina brillians</i>) Pulgón (<i>Aphis illinoisensis</i>) Trips (<i>Frankliniella</i> sp)	1.0 a 1.5



DE VENTA EN:
Innovación Agrícola®

innovacionagricola.com
01 800 248 8800



CULTIVO	PLAGA	ML/100
Aguacatero (7)	Agalla del aguacatero (<i>Trioxa anceps</i>) Barrenador de las ramas (<i>Copturus aguacatae</i>) Barrenador grande del hueso (<i>Heilipus lauri</i>) Barrenador pequeño del hueso (<i>Conotrachelus aguacata</i>) Mosca verde del aguacate (<i>Aethalion quadratum</i>) Palomilla del hueso (<i>Stenoma catenifer</i>) Periquillo del aguacate (<i>metcalfiella monogramma</i>)	125
Lima (7), limonero (7), naranjo (7), tangerina(7), toronja (7)	Escama roja de California (<i>Aonidiella aurantii</i>) Escama roja de Florida (<i>Chrysomphalus aonidum</i>) Gusano perro (<i>Papilio crespontes</i>) Piojo harinoso (<i>Planococcus citri</i>) Pulgón negro (<i>Toxoptera aurantii</i>)	125
	Trips (<i>Scirtothrips citri</i>)	75 - 200
Chabacano (7) Durazno (7)	Chinche de encaje (<i>Corythucha mcelfreshi</i>)	125
	Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	125 a 150
Guayabo (2)	Piojo Harinoso (<i>Phenacoccus psidiarum</i>) Mosca de la fruta (<i>Anastrepha serpentina</i> , <i>Anastrepha striata</i>) Picudo de la guayaba (<i>Conotrachelus dimidiatus</i>)	125 a 150
Mango (2)	Escama del mango (<i>Coccus mangiferae</i>) Mosca de la fruta (<i>Anastrepha obliqua</i> , <i>Anastrepha ludens</i>)	125 a 150
Manzano (3) membrillo(3) peral (1)	scama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Frailecillo (<i>Macrodactylus infuscatus</i>) Pulgón lanígero (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Pulgón verde del manzano (<i>Aphis pomi</i>)	125
	Palomilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	100 a 125
Nogal pecanero (S/L)	Pulgón negro (<i>Melanocallis sp</i>)	125
Papayo (S/L)	Mosca de la papaya (<i>Toxotrypana curvicauda</i>)	125 a 150

() Intervalo de seguridad en días. S/L = Sin límite.
 Tiempo de reentrada: No permitir la entrada a las áreas tratadas hasta **24 horas después de realizada la aplicación**. * En frutales dosis por cada 100 L de agua.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.
 Con equipos de aplicación de mochila o tractor utilice como máximo 100 L de agua/ha; en aplica- ciones aéreas diluya en no menos de 25 L de agua/ha.
 Para obtener una mejor calidad en la aplicación de FYFANON 1000 CE/MALATHION 1000 CE (co- bertura, dis- persión, extensión y humectación), es recomendable el uso de un coadyuvante no iónico y en caso necesario un acondicionador de agua para aspersión.

CONTRAINDICACIONES. Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento sea mayor a 15 km/hora.

FITOTOXICIDAD: Este producto es fitotóxico en manzano en las variedades McIntosh y Cortland. En vid para las variedades River, Italia, Cardenal y Almería. Es recomendable efectuar pruebas preliminares para evitar daños de fitotoxicidad.

INCOMPATIBILIDAD. Este producto no es compatible con los agroquímicos de naturaleza alcalina como NaOH (hidróxido de sodio) y productos oxidantes como el H2O2 (peróxido de hidrógeno), así como con los fungicidas: caldo bordelés, oxiclورو de cobre; hidróxido de cobre; óxido cuproso; polisulfuro de calcio.