

"USO AGRÍCOLA"



Glifosato
HERBICIDA Y DESECANTE AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:

Glifosato: Sal de potasio N-(fosfonometil)-glicina, con un contenido de ácido glifosato no menor de 81.61% [Equivale a 363 g de i.a. (ácido glifosato)/L a 20°C]

Ingredientes inertes:

Acarreador, anticongelante, antiespumante, colorante y surfactante.

Porcentaje en peso:

No menos de.....35.6%

No más de.....64.4%
TOTAL.....100.0%

CONTENIDO NETO: 10 L

Reg. RSCO-HEDE-0230-346-375-036



Nocivo si se inhala

® Marca Registrada por
Monsanto Comercial,
S.A. de C.V.

MONSANTO 

HECHO EN MÉXICO

Titular y Distribuidor:

Monsanto Comercial S.A. de C.V.
Pasaje del Cerezo No. 880, Nextipac,
Zapopan, Jalisco C.P. 45220
Tel. (55) 5245-9600
RFC: MCO-701113-C54

Lote No.

Fecha de fabricación:

Válida en el tiempo del envase

Fecha de caducidad:

2 años a partir de la f. de fab.

PRECAUCIÓN

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZA AQUÍ RECOMENDADOS"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

RECOMENDACIONES DE USO
FAENA® CLÁSICO es un herbicida formulado como concentrado soluble en agua para ser aplicado al follaje de la maleza que se recomienda en la tabla. Este producto es absorbido por las hojas y llega hasta las raíces y otras partes de la maleza ya brotada.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (L/ha)
Limónero, naranjo, mandarino, toronja, tangerina	Hoja angosta: Zascale peludo (<i>Rottboellia exaltata</i>) Hoja ancha: Quile (<i>Amaranthus spinosus</i>), barba de vago (<i>Barnadesia</i>), yerba alfincha (<i>Melisso viridifolia</i>), gongrina (<i>Euphorbia hirta</i>)	2.0 - 3.0 3.0 - 4.0
Maíz, sorgo (SL)	Hoja angosta: Zascale de año (<i>Panicum fasciculatum</i>), zascale chino (<i>Ischaemum arizonicum</i>) Hoja ancha: Verdolaga de puerco (<i>Trianthema portulacastrum</i>)	3.0 - 4.0 3.0 - 4.0
Sorgo (7)	Corno desecante en el cultivo	2.0 - 3.0

() Intervalo de seguridad = días que deben transcurrir entre aplicación y cosecha
 SL = Sin límite
 Periodo de resaca = 12 horas

1. USO COMO DSECCANTE EN EL CULTIVO DE SORGO

Realizar una aplicación total cuando se haya completado el llenado del grano y éste tenga un contenido de humedad promedio entre 28 y 30% en madurez fisiológica y se observe la caída negra del grano. No aplicar en estado lechoso-masoso o más temprano. Calibrar el equipo de aplicación para asperjar un volumen de 200 L/ha a una presión de 30 lb/pulg² utilizando boquillas de abanico plano normal 11002 VS, 11003 VS o similares.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el producto, sostenga firmemente el cuerpo del envase y gire la tapa en contra de las manecillas del reloj. Llenar el tanque de la aspersora hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada y completar el llenado del tanque con agua. Calibrar su equipo de aplicación, aplicar un volumen de mezcla de 200 L/ha utilizando boquillas de abanico plano normal 11002 VS, 11003 VS o similares. Aplicar la mezcla a una altura de 15 a 30 cm. Utilizar agua con contenido de sales menor a 500 ppm. En caso de que el contenido de sales sea superior, neutralizar el agua previo a la adición del herbicida mediante la adición de un acondicionador de pH en dosis de 1 g/L de mezcla hasta ajustar a un pH de 5.0.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar con vientos mayores de 10 km/hr para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. Para su uso como desecante en sorgo, no aplicar cuando el cultivo se encuentre en estado lechoso-masoso o más temprano. Permitir un mínimo de siete días entre la aplicación y la cosecha.

INCOMPATIBILIDAD

FAENA® CLÁSICO es compatible con otros herbicidas, condyuvantes o fertilizantes. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con los productos registrados en el cultivo recomendado en la etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

"Manejo de Resistencia"

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."

FITOTOXICIDAD

FAENA® CLÁSICO no es fitotóxico a los cultivos indicados si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. **FAENA® CLÁSICO** no tiene actividad en el suelo por lo que no define la emergencia de los cultivos.



"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto como goma y overol de algodón, mascarilla, guantes protectores, guantes y botas de hule.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRALES.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACION.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANENSE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOCUILLA CON LA BOCA.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de contacto directo con la piel, lave inmediatamente la parte afectada con abundante agua y jabón. Al contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, aísle al paciente y colóquelo en posición cómoda para reposo, asegúrese que pueda respirar sin dificultad. Tome mucha agua para diluir el producto ingerido.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

El glicosilo es un derivado del ácido N-(tosilomemil)-glicina. No existe antídoto específico, en caso de intoxicación proporcione tratamiento sintomático. Produce irritación al contacto con la piel y ojos ocasionando dolor, enrojecimiento y lagrimeo. La ingestión o inhalación accidental de grandes cantidades de este producto puede causar irritación al tracto gastrointestinal, vómito, diarrea, tos, dolor de pecho, grito nasal e irritación de la garganta. Si el producto es ingerido y la persona está inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir al paciente absolutamente nada por la boca. Si el paciente no respira o respira con dificultad, proporcione oxígeno o respiración artificial.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CON CUIDADO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, ENTRE MANEJADO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (5 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENLAVADO EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

RIESGOS ECOLÓGICOS
EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

