



**PARA PROTEGER TU CULTIVO,
DEKALB® TE RECOMIENDA.**



FAENA® Clásico es la **MARCA DE HERBICIDA MÁS RECONOCIDA** en México, que ofrece un mejor valor a los agricultores a diferencia de productos imitadores.

¿PARA QUIÉN ES FAENA®?

Para el agricultor que va a la segura, **FAENA®** es el herbicida que ofrece seguridad y un control efectivo porque a través de los años ha demostrado y probado ser la mejor opción en el campo.

VENTAJAS

FAENA® ofrece más de 30 años de desempeño probado en el campo.

BENEFICIOS

Puede sentirse seguro de que obtendrá un control confiable de maleza en su campo.





PARA PROTEGER TU CULTIVO,
DEKALB® TE RECOMIENDA.



FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial
FAENA CLÁSICO

Ingrediente activo y composición

Sal de potasio de glifosato - 363 g/L

Categoría

Herbicida y desecante agrícola

Modo de acción

Sistémico. Postemergencia.

Tipo de formulación

Concentrado soluble

Registro Sanitario

RSCO-HEDE-0230-346-375-036

Logotipo



Categoría toxicológica

5 - PRECAUCIÓN

Símbolo



Palabra de advertencia

Nocivo si se inhala

Cultivos y usos autorizados

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (L/ha)
Limonero, naranjo, mandarino, toronja, tangerina	Hoja angosta: Zacate peludo (<i>Rottboellia exaltata</i>)	2.0 – 3.0
	Hoja ancha: Quelite (<i>Amaranthus spinosus</i>), Barba de viejo (<i>Boerhavia erecta</i>), Hierba alfombra (<i>Mollugo verticillata</i>), Golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>)	3.0 – 4.0
Maíz, sorgo (SL)	Hoja angosta: Zacate de año (<i>Panicum fasciculatum</i>), Zacate chino (<i>Dactyloctenium aegyptium</i>)	3.0 – 4.0
	Hoja ancha: Verdolaga de puerco (<i>Trianthema portulacastrum</i>)	3.0 – 4.0
Sorgo ¹ (7)	Como desecante en el cultivo	2.0 – 3.0
Algodonero genéticamente modificado tolerante a glifosato (SL)	Hoja ancha: Quelite (<i>Amaranthus palmeri</i>), Amargosa (<i>Partenium hysterophorus</i>)	4.0 – 6.0
	Correhuela: (<i>Convolvulus arvensis</i>) ²	5.0 – 6.0
Maíz genéticamente modificado tolerante a glifosato (SL) LMR tomado del CODEX Alimentarius. (Realizar aplicación total en el maíz tolerante a glifosato en póst-emergencia a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación 270-370 L de agua/ha)	Hoja angosta: Zacate de agua (<i>Echinochloa colona</i>)	2.0 – 4.0
	Hoja ancha: Malva (<i>Anoda pentaschista</i>), Meloncillo (<i>Cucumis melo</i>), Guachapote (<i>Xanthium strumarium</i>)	2.0 – 4.0
Soya genéticamente modificada tolerante a glifosato (SL). LMR tomado del CODEX Alimentarius. (Realizar aplicación total en el soya tolerante a glifosato en póst-emergencia al cultivo y maleza; volumen de aplicación 200 L /ha)	Hoja angosta: Zacate cola de zorra (<i>Leptochloa filiformis</i>)	4.0 – 6.0

() Intervalo de seguridad = días que deben transcurrir entre aplicación y cosecha

SL = Sin límite

Tiempo de reentrada a la zona tratada = 4 horas

Indicaciones especiales

(1) USO COMO DESECANTE EN EL CULTIVO DE SORGO Realizar una aplicación total cuando se haya completado el llenado del grano y éste tenga un contenido de humedad promedio entre 28 y 30% en madurez fisiológica y se observe la capa negra del grano. No aplicar en estado lechoso-masoso o más temprano. Calibrar el equipo de aplicación para asperjar un volumen de 200 L/ha a una presión de 30 lb/pulg² utilizando boquillas de abanico palno normal 11002VS, 11003 VS o similares.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

