

Kocide® 2000

FUNGICIDE/BACTERICIDE

FICHA TÉCNICA

Proveedor :

KOCIDE LLC
9145 Guilford Road , Suite 175
Columbia , Maryland 21046, USA
Tel. 01 800 255-3924

Distribuido por :

CERTIS AGRO MEXICO
Bosque de los Ciruelos 180
Col. Bosques de las Lomas , 11700 , Cd de Mex.

Teléfono de Emergencias : (55) 5598-6659 / (55) 5611-2634 Lada sin costo 01-800-00-928-00

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre Comercial

KOCIDE 2000

Ingrediente Activo

HIDROXIDO CUPRICO

Grupo Químico

FUNGICIDA CUPRICO

Tipo de Producto

FUNGICIDA AGRICOLA

Usos identificados

FUNGICIDA Y BACTERICIDA AGRICOLA

Formulación

GRANULOS DISPERSABLES

Concentración

53.8 % con contenido de cobre metálico al 35%

Equivalente en Gramos

350 gr / Kilo

Ingredientes Inertes

Dispersantes ,surfactantes , diluyente y desintegrante

Registro COFEPRIS

RSCO-FUNG-0319-356-034-054

250

RECOMENDACIONES DE USO

El Fungicida y Bactericida **Kocide® 2000** es un producto preventivo, por lo que, para obtener mejores resultados debe aplicarse antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad o bien, cuando las condiciones climáticas sean favorables al desarrollo y diseminación de éstas.

RECOMENDACIONES DE USO			
CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS Kg/Ha
Aguacatero*	Roña Antracnosis	<i>Sphaceloma perseae</i> <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.300 – 0.500/ 100L de agua
Berenjena*	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.850 – 3.362
Brócoli* Col* Coliflor* Col de Bruselas*	Pudrición bacterial	<i>Erwinia carotovora</i>	0.750-1.5
Cafeto*	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	2.0 – 3.0
Chile*	Tizón temprano Mancha bacteriana	<i>Alternaria solani</i> <i>Xanthomonas vesicatoria</i>	0.850 – 3.362 1.5 – 3.0
Jitomate*	Tizón temprano Tizón tardío Mancha bacteriana	<i>Alternaria solani</i> <i>Phytophthora infestans</i> <i>Xanthomonas vesicatoria</i>	0.850 – 3.362 1.5 – 3.0
Lima* Limonero* Mandarino* Naranja* Toronjo*	Mancha grasienta	<i>Mycosphaerella citri</i>	0.300 – 0.500 / 100L de agua
Papa*	Tizón temprano Tizón tardío	<i>Alternaria solani</i> <i>Phytophthora infestans</i>	0.850 - 3.362
Calabacita* Calabaza* Chayote* Melón* Pepino* Sandía*	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2.0 - 2.5

Intervalo y Época de aplicación : Use las dosis mayores en la medida de que el grado de infección aumente en cultivos en pleno desarrollo , con abundante follaje , o cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de la enfermedad. Repita las aplicaciones a intervalos de 6 – 7 días . Aplíquese con el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura. El producto puede ser aplicado con equipo convencional , terrestre o aéreo. Periodo de Re-entrada son 12 hrs.