

PROTECTIN®

Insecticida Agrícola

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PROTECTIN® es un insecticida-acaricida cuyo ingrediente activo (Abamectina) es el resultante de la fermentación del hongo del suelo *Streptomyces avermitilis*. Es altamente activo a dosis bajas, actúa por contacto e ingestión con acción translaminar y sistémica localizada, controla eficientemente ácaros e insectos formadores de minas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO

Abamectina

NOMBRE QUÍMICO

Mezcla de avermectinas B1 conteniendo no menos de 82% de avermectina B1a y no más de 10% de avermectina B1b.

CONTENIDO DE INGREDIENTE ACTIVO

18 g/L

% EN PESO

1.80% de I.A.

FORMULACIÓN

EC Concentrado emulsionable

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

4 Precaución / Nocivo si se inhala / Nocivo en caso de ingestión

REGISTRO COFEPRIS

RSCO-INAC-0174-350-009-002

PRESENTACIÓN

1 L y 250 ml



FICHA TÉCNICA

USO AUTORIZADO EN MÉXICO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Jitomate Chile (3) Papa	Minador de la hoja (<i>Liriomyza trifolii</i>) Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5 - 1.0	Realizar dos aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 450 L/ha.
Aguacate (14)	Araña roja (<i>Oligonychus perseae</i>)	50 - 150 ml/100 L agua	Realizar las aplicaciones en cuanto observe los primeros adultos.
Limón Mandarino Toronjo (7) Naranja	Negrilla de los cítricos (<i>Phyllocoptruta olleivora</i>) Araña roja (<i>Panonychus citri</i>)	0.5 - 1.5	Realizar las aplicaciones en cuanto observe los primeros adultos. Proteja en etapa de floración y fructificación.
Fresa Frambuesa (3) Zarzamora	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.4 - 0.6	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días. Aplicar en etapa de fructificación.
*Ajo *Cebolla *Cebollín (7) *Poro	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.)	0.5 - 0.7	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, cuando se detecten las primeras minas de la plaga.
Manzano (28)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5 - 1.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación 720 - 820 L de agua/ha.
Papayo (7)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	500 - 700 ml/1000 L agua	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días.
Maíz (7)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.3 - 0.5	Realizar una aplicación al follaje, de ser necesario realizar una adicional a intervalo de 14 días. Volumen de aplicación 500 - 600 L agua/ha
Lima Limón Mandarino (7) Naranja Toronjo	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	25 - 100 ml/100 L agua	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros individuos.
() = Intervalo de seguridad en días SL = Sin Límite *Registro en trámite			

Horas de Reentrada: 24 Horas