

Scala® 60 SC

Fungicida / Suspensión concentrada

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

PIRIMETANIL

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	% en peso
Pirimetanil: N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilina	54.6
(Equivalente a 600 g. i.a./L a 20°C)	
Ingredientes inertes:	
Dispersante, humectante, antiespumante, adherente, anticongelante y agua	45.4
TOTAL	100.0

Categoría toxicológica:

Precaución (V)

No. de Registro:

RSCO-FUNG-0301G-301-064-055 – Vigencia indeterminada

Sistemicidad:

Sistémico-Local	Contacto	Translaminar
X		X

Descripción:

Fungicida sistémico local de aplicación foliar en formulación concentrada con acción específica y contundente contra el Tizón temprano, Moho gris y Mancha púrpura en cultivos de solanáceas, berries, cebolla, vid y rosál.

USOS

Cultivo	Enfermedades		Dosis L/ha	Indicaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Cebolla (7)	Mancha púrpura	<i>Alternaria porri</i>	1.25 – 1.50	Iniciar las aplicaciones al follaje cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad y dependiendo del grado de infección se podrán realizar hasta 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Realizar la aspersión dirigida al cuello de la planta cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar tres aplicaciones a intervalos de siete días, con un volumen de hasta 800 L/ha.
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 – 1.50	
Jitomate (1)	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	1.25 – 1.50	Realizar las aplicaciones al follaje cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. El volumen de agua a utilizar es de 400 a 600 L/ha.

Jitomate (1)	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.25 – 1.50	Iniciar las aplicaciones al follaje cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o desde el inicio de la fructificación. Para cultivos en invernadero se recomienda realizar hasta 4 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, utilizando un volumen de agua de hasta 1600 L/ha.
Papa (1)	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	1.25 – 1.50	Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicar al follaje a intervalos de 7 días.
Fresa Frambuesa Arándano Grosella Zarzamora (1)	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 – 1.5	
Rosa (SL)	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.7 a 0.8	
Vid (7)	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0-1.5	Realizar dos aspersiones, al follaje, a intervalo de siete días.
Jitomate Chile* (1)	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	2-3 mL/L de agua	Para condiciones de Agricultura Protegida: Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad, o al observar los primeros síntomas en el cultivo. Realizar tres aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. * LMR tomado de Unión Europea.

El tiempo de reentrada a las áreas tratadas es de 24 horas.

() Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L