



Bayer CropScience

Si es Bayer, es bueno

SENCOR[®] 480 SC

Herbicida agrícola

Suspensión concentrada acuosa

Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL:	Porcentaje en peso
-------------------------	-----------------------

Ingrediente activo:

Metribuzin: 4-amino-6-(1,1-dimetiletil)-
-3-(metiltio)-1,2,4-triazin-5(4H)-ona.

No menos de:41.0%

(Equivalente a 480 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Diluyente, dispersante y espesante

No más de:59.0%

Total: 100.0%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: SENCOR[®] 480 SC es un producto ligeramente tóxico para humanos y animales. Puede ser fatal si se ingiere, inhala o absorbe por la piel. Guárdelo bajo llave. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas-habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase. Manéjelo con equipo completo de protección: mascarilla, guantes y ropa protectora.

No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación. Después de la aplicación, báñese o lávese bien con agua y jabón y cámbiese de ropa.

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

Antes de la aplicación, calibre su equipo y utilice las boquillas adecuadas. Cuando siembre variedades nuevas de papa y tomate, con tolerancia desconocida frente a SENCOR[®] 480 SC trate sólo una pequeña área, para determinar si el producto se puede usar sin causar daños al cultivo. No aplique dentro de los 3 días siguientes de tiempo frío, húmedo o nublado, para evitar daños a los cultivos de papa y tomate.

Precauciones para el uso de SENCOR[®] 480 SC en tomate: Las plantas de tomate pueden sufrir daños, especialmente cuando ocurren lluvias excesivas después del tratamiento en áreas con drenaje muy pobre.

La aplicación de SENCOR[®] 480 SC en tomate tratado con Disyston[®], puede causar fitotoxicidad. Deje por lo menos 14 días entre cada aplicación, independientemente del método de aplicación y de la dosis. Pueden ocurrir daños al cultivo o retraso en la madurez, cuando las aplicaciones se realicen sobre tomates que estén creciendo bajo condiciones de estrés, como periodos de sequía o frío antes de la aplicación. SENCOR[®] 480 SC debe aplicarse siguiendo estrictamente las recomendaciones de uso.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y CONTRA LAS MALEZAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivos	Malezas		Dosis (cc/ha)	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Espárrago	Quelite Chuales Tomatillo Zacate salado Zacate pinto Zacate de agua Zacate Bermuda Correhuela Zacate cola de zorra	<i>Amaranthus spp</i> <i>Chenopodium spp</i> <i>Physalis sp</i> <i>Leptochloa sp</i> <i>Echinochloa sp</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Convolvulus arvensis</i> <i>Setaria sp</i>	1250 a 3500	Realizar la aplicación en prebrotación. En el caso de plantíos recién establecidos utilizar la dosis de 1,250 cc.
Maíz	Quelite Zacate cola de zorra Zacate pitillo Coquillo Mirasol Nabo	<i>Amaranthus spp</i> <i>Setaria sp</i> <i>Setaria spp</i> <i>Cyperus spp</i> <i>Helianthus annus</i> <i>Brassica spp</i>	365	Aplicar en preemergencia al cultivo y a la maleza + 1 a 2 kg o L de atrazina. Aplicar la mezcla con buena humedad pero sin charcos. Variedades nuevas de maíz, realizar una pequeña prueba de fitocompatibilidad.
Papa	Mirasol Agritos Correhuela Mala mujer Quelite Chía Bromo Quesito	<i>Helianthus annus</i> <i>Oxalis sp</i> <i>Ipomoea purpurea</i> <i>Helianthus lacinated</i> <i>Amaranthus spp</i> <i>Salvia tiliaefolia</i> <i>Bromus carinatus</i> <i>Anoda cristata</i>	750 a 850	Aplicar en pre o postemergencia a la maleza y al cierre del cultivo.
Tomate	Quelite Nabo Mostacilla Golondrina Trébol Lechuguilla Tomatillo Morraja Alpistillo Alambrillo Malva Verdolaga Lengua de vaca Alfombrilla Avena silvestre Mirasol	<i>Amaranthus spp</i> <i>Brassica spp</i> <i>Sisymbrium irio</i> <i>Euphorbia spp</i> <i>Melilotus indicus</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Sonchus arvensis</i> <i>Phalaris minor</i> <i>Poligonum aviculare</i> <i>Malva spp</i> <i>Portulaca oleraceae</i> <i>Rumex crispum</i> <i>Euphorbia sp</i> <i>Avena fatua</i> <i>Helianthus annus</i>	500 a 700	Siembra directa Preemergencia
			400 a 600	Postemergencia
Soya	Quelite Nabo Mirasol Golondrina	<i>Amaranthus spp</i> <i>Brassica spp</i> <i>Helianthus annus</i> <i>Euphorbia spp</i>	500 a 700 500 a 700	Trasplante: Preplanteo Pretrasplante
			600 a 700	Posplanteo Postrasplante al cierre de cultivo.
Trébol	Tomatillo Lechuguilla Malva Verdolaga Lengua de vaca	<i>Melilotus indicus</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Sonchus oleraceae</i> <i>Malva spp</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Rumex crispum</i>		Cuando los suelos tienen superficie calcárea o pH mayor a 7.5 puede haber fitotoxicidad. Preemergencia.

BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V., DIVISION BAYER CROPSCIENCE

Blvd. M. de Cervantes Saavedra Núm. 259 - Col. Granada - 11520 México, D.F. - Tel.: (55) 5728-3000 - Fax: (55) 5728-3125

FITOTOXICIDAD: Dosis excesivas pueden causar quemaduras, amarillamiento o detener el crecimiento del cultivo. SENCOR® 480 SC nunca debe aplicarse en cultivos establecidos en suelos arenosos, con exceso de sales o dañados por otros factores, pues de hacerlo así, ocasionará fitotoxicidad. Aplique siempre con la mayor humedad del suelo, pero sin charcos, nunca en suelos secos.

¡No remueva la tierra después de aplicar el herbicida!

SENCOR® 480 SC permanece en el suelo por no más de 90 a 100 días, por lo que no causará problemas a los cultivos subsiguientes pasando este lapso. Si por algún motivo el cultivo tratado con SENCOR® 480 SC puede ser rastreado, consulte nuestro servicio técnico antes de establecer otro cultivo.

CONTRAINDICACIONES: Almacenar a una temperatura menor a 40°C y lejos de materiales para consumo humano y animal.

INCOMPATIBILIDAD: SENCOR® 480 SC sólo deberá mezclarse con productos registrados y en cultivos autorizados por la CICOPALFEST, se recomienda realizar pruebas preliminares de compatibilidad.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Si la intoxicación fue por ingestión y el paciente está consciente, induzca el vómito con una cucharada de agua tibia con sal o introduciendo un dedo en la garganta. Si fue por contacto, quite la ropa impregnada y lávelo, abríguelo y recuéstelo en un lugar ventilado. Si está inconsciente no administre nada por la boca y vigile que respire sin dificultad.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Este producto pertenece al grupo químico de las **triazinas**.

Síntomas: Los síntomas no son específicos, por lo general se presentan como flacidez, debilitamiento, convulsiones, dificultad en la respiración y contracciones nerviosas. El tratamiento debe ser sintomático. La terapia en niños debe ser supervisada por el médico.

URGENCIAS: En caso de intoxicación por nuestros productos, llame al Servicio de Información Toxicológica (SINTOX/AMIFAC) las 24 horas del día.

Area metropolitana: 5598-6659 y 5611-2634.

Lada sin costo: 01-800-0092800.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Este producto es tóxico para peces y aves. No contamine fuentes y depósitos de agua, arroyos o canales al limpiar equipos o vaciando sobrantes del producto. Aplique el procedimiento del triple lavado al envase vacío y deposite el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde preparó la mezcla (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). Si hay derrames, aplique inertes absorbentes (polvo, aserrín, ceniza) sobre el producto derramado. Deje que se absorba por completo, depositar en recipientes metálicos con tapa y dar el tratamiento indicado por la autoridad competente. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Transporte y almacene este producto en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado, en lugar seguro, lejos del calor o fuego directo. Nunca junto con alimentos, ropa o forrajes.

GARANTIA: Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación del producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Bayer CropScience y/o sus distribuidores no se hacen responsables del uso y resultados del producto.

En caso de exportación de los productos agrícolas tratados con este agroquímico, el usuario debería cerciorarse sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a: cultivos autorizados, tolerancias, tiempos de espera y residuos. Bayer de México, S.A. de C.V., División Bayer CropScience sólo responde de la formulación correcta y el contenido neto. En caso de duda, consulte las publicaciones respectivas o al técnico de la región.