

POLVO HUMECTABLE



Fungicida biológico formulado a base de Trichoderma sp.

Trichocrop® inhibe el crecimiento de hongos fitopatógenos a través de mecanismos directos e indirectos tales como competencia por espacio y nutrientes, micoparasitismo y antibiosis.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingredientes activo: <i>Trichoderma spp</i> (Equivalente a 20 g de i.a./Kg) Conteniendo no menos de 1.0×10^8 UFC/g	2.0

Registro No.: RSCO-FUNG-0301S-X0252-002-2.00

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	Dosis (g por Ha)	Observaciones
Cebolla, Ajo, Poro, Espárrago, Cebollín (0)	Damping off (<i>Pythium aphanidermatum</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	400-600	Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 10 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 600 L de agua /ha
Arándano, Fresa, Frambuesa, Grosella, Zarzamora, Vid, Kiwi (0)	Damping off (<i>Pythium debaryanum</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Phytophthora fragariae</i>)	400-800	
Aguacate (0)	Tristeza del aguacate (<i>Phytophthora cinnamomi</i>)	500 - 1000	Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 20 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 400 L de agua /ha
Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas, Mostaza, Colza, Colinabo (0)	Damping off (<i>Pythium aphanidermatum</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	400-600	Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 10 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 700 L de agua /ha
Pepino, Melón, Calabaza, Sandía, Calabacita, Chayote (0)	Damping off (<i>Pythium aphanidermatum</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	300-500	Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 10 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 800 L de agua /ha
Chile, Jitomate, Berenjena, Papa Tabaco (0)	Damping off (<i>Fusarium spp</i>)	500 - 600	Realizar dos aplicaciones in drench la 1era al momento del trasplante y la 2da 7 días después; volumen de aplicación 20 mL de la mezcla/planta.

POLVO HUMECTABLE



CULTIVO	PLAGA	Dosis (g por Ha)	Observaciones
Limón, Naranja, Mandarina, Toronja, Lima, Pomelo, Cidro, Tangerino (0)	Marchitez (<i>Fusarium oxysporum</i>)	400 - 600	Realizar 3 aplicaciones in drench a intervalo de 20 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad: volumen de aplicación sugerido 600 L de agua /ha

() Intervalos de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y cosecha: (0) cero días
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Puede reentrarse al cultivo tratado una vez que la aplicación se ha secado.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Abra el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese la cantidad de producto a utilizar con la ayuda de una báscula o con algún otro utensilio graduado específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión. Durante el manejo, preparación y aplicación del producto utilizar el equipo de protección personal indicado en la sección “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”, información disponible en la presente etiqueta.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso: cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

FITOTOXICIDAD: **Trichocrop®** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA: No se recomienda mezclar **Trichocrop®** con otros productos agroquímicos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, lentes de seguridad con protección hermética o careta facial, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla con respirador. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventiado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de sobreexposición, retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo.

En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. **Si cayó en los ojos;** lavar con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, consulte un médico. **En caso de ingestión** accidental y si la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de inducir nada en la boca sin deglutir, consulte a su médico. **Si cayó en la piel** lávese con abundante agua limpia y jabón. Consulte a su médico.

POLVO HUMECTABLE



EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS (55) 5598-6659, (55) 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.



An American Vanguard Company

Avenida Vallarta 6503 Local B17, Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45010
Tel: (33) 3110 1976
800 00 AMVAC (26822)

HECHO EN MÉXICO



www.amvac.com.mx

[f amvacmexico](#) [in amvac mexico](#)