
FUNGIRED

FUNGICIDA

INFORMACIÓN GENERAL

El FUNGIRED es un excelente fungicida para el control preventivo y curativo de hongos de suelo que atacan el área radicular y foliar de los cultivos establecidos.

Estos hongos de suelo al ir dañando los órganos de las plantas las van debilitando y ocasionando que estas mermen su desarrollo, estos órganos como raíz, tubérculo, bulbo y frutos llegan a ser de bajo o nulo valor comercial, por lo cual es recomendable hacer uso de manera preventiva para un mejor desempeño del mismo.

Es una formulación fungicida, el cual actúa por contacto al tocar las zonas infestadas por hongos principalmente en hojas, raíces y tubérculos.

Al contener los coadyuvantes necesarios se hace de FUNGIRED un fungicida con efecto de control más residual y duradero que la mayoría en su tipo.

CARACTERÍSTICAS DE FUNGIRED

Composición porcentual

Ingrediente activo:	% en peso
Fluazinam: 3-Cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)-alfa, alfa, alfa-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidina	
No menos de:	40.4%
(Equivalente a 500 g de I.A. /L)	
Ingredientes inertes:	
Diluyente (agua), dispersante, antiespumante, estabilizador y compuestos relacionados	
No más de:	59.6%
Total:	100.00%

APLICACIÓN DE FUNGIRED

Se recomienda el uso de FUNGIRED en los siguientes cultivos y sobre las principales enfermedades que los atacan, de preferencia realizar aplicaciones por las mañanas o por la tarde, que las temperaturas no sean altas al momento de aplicación, realizar pruebas de compatibilidad premezclado antes de usar el producto de manera general.

Cultivo	Enfermedad		Dosis (L/Ha)	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Papa	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4 a 0.5	Inicie al germinar el cultivo y con condiciones para la enfermedad, al cierre de cultivo use la dosis alta elevando el gasto de agua para tener la mayor cobertura y así obtener la mayor eficiencia del producto Para la protección sobre enfermedades del suelo se sugiere aplicar el producto el banda antes de que sean tapadas las semillas, usar el volumen de agua suficiente para proteger lo mejor posible a la semilla depositada. Para proteger el cuello se recomienda aplicar 0.5 litros por hectárea 20 a 30 días después de la emergencia
	Costra negra	<i>Rhizoctonia solani</i>	2 a 3	
	Roña	<i>Streptomyces scabies</i>	3	
	Sarna	<i>Spongospora subterranea</i>		
Frijol	Moho blanco	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	0.5 (avión) 0.75 (riego)	Iniciar las aplicaciones en floración y formación de vainas, repetir cada 10 días, dependiendo las condiciones favorables para la enfermedad, utilice un volumen de 300 a 400 Litros de agua por hectárea.

Se recomienda aplicar mediante avión y/o aspersoras terrestres de alto y bajo volumen montadas al tractor con volúmenes necesarios para tener una cobertura que ayude a tener el mayor porcentaje de control sobre la enfermedad que se encuentre en el cultivo establecido.

TIEMPO DE REENTRADA: Para mayor seguridad del personal de trabajo, espere a que haya transcurrido por lo menos 24 horas o haya secado bien el producto aplicado para reingresar a las áreas tratadas.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE FUNGIRED

Aunque es un producto de baja toxicidad se sugiere que como tal, se debe manejar con los cuidados y precauciones requeridas, como son: uso de guantes, goggles, botas y mascarilla de seguridad.

En caso de contacto la piel se debe lavar de inmediato con suficiente agua salina y jabón, aplicando glicerina sobre las zonas afectadas. Si hay contacto con los ojos, lavar de inmediato con suficiente agua y jabón, por espacio de 20 minutos.

En caso de ingestión del producto, solicite auxilio al médico y mientras tanto, suministre al paciente la cantidad que pueda ingerir de agua, clara de huevo, leche o harina con agua para neutralizar la acción del producto. NO PROVOCAR EL VÓMITO. No reutilice los envases vacíos y mantenga este producto alejado de los niños, animales y personas inexpertas. No almacene junto alimentos, NO SE EXPONGA A FUERTE RADIACION SOLAR O FUENTES DE CALOR.
