



Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

Luna[®] Sensation

Fungicida / Suspensión concentrada

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:

Fluopyram + Trifloxystrobin

Composición porcentual:**Ingredientes activos:**

% en peso

Fluopyram: N-[2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridil]etil]-a,a,a-trifluoro-orto-toluamida.....21.37
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)

Trifloxystrobin: metil (E)-metoxiimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenoaminoxil]-o-tolil}acetato.....21.37
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)

Ingredientes inertes:

Dispersantes, espesante, anticongelante, conservadores, antiespumante, portador.....57.26

TOTAL **100.00**

Categoría toxicológica:

4 Precaución

No. de Registro:

RSCO-MEZC-FUNG-1302-0394-X0099-064-42.74

Descripción:

LUNA SENSATION es un fungicida de amplio espectro con propiedades preventivas, curativas y con actividad sistémica, que previene y controla las enfermedades indicadas en la tabla de usos.

USOS

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS L/ha	RECOMENDACIÓN
Calabaza Calabacita Melón Pepino Sandia Chayote (0)	Cenicilla polvorienta (<i>Podosphaera xanthii</i>)	0.4 – 0.5	Realice de 1 a 3 aspersiones foliares, inicie las aplicaciones de forma preventiva y/o al inicio de la infección, a un intervalo de 7 días. Utilice entre 490 a 650 L/ha. Fuente LMR: EPA
Chile Berenjena Tomate de cáscara Jitomate (3)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	0.4 – 0.6	Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar de forma foliar y realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días. Se recomienda un volumen de agua de 250-350 L. Fuente LMR: EPA

Ficha técnica - Productos Fitosanitarios

Fresa (SL) Frambuesa Grosella Arándano Zarzamora (7) Vid (14)	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.5 – 0.6	Iniciar las aplicaciones cuando haya condiciones favorables para la enfermedad o al observar los primeros síntomas, realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días, dirigidas al follaje. Se recomienda un volumen de agua de 370-470 L por hectárea. Fuente LMR: EPA
Manzano Peral Tejocote Membrillo (14)	<i>Cenicilla</i> (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0.5	Iniciar la aplicación en la etapa de brotación y floración, cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o al observar los primeros síntomas, realizar 3 aplicaciones a intervalo de 14 días. Se recomienda un volumen de agua de 950-1050 L/ha. Fuente LMR: EPA
Vid (14)	Cenicilla polvorienta (<i>Uncinula necator</i>)	0.3 – 0.6	Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar de forma foliar y realizar 2 aplicaciones a intervalo de 14 días. Se recomienda un volumen de agua de 440-540 L. Fuente LMR: EPA
Rosal (SL)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0.5 – 0.6	Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad, usar un volumen de agua de 4100-4200 L. realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días.
Limón Naranja Lima Mandarina Pomelo Cidro Tangerino Toronja (7)	Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	0.5 – 0.6	Realizar la primera aplicación en la etapa fenológica de botón blanco (antes de que abra la flor), la segunda aplicación con la flor abierta y la tercera cuando caen los pétalos. El intervalo de aplicación deberá ser de 7 días, utilizar un volumen de 550-650 L/ha.

El tiempo de reentrada a las áreas tratadas es de 12 horas.

() Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

El número de aplicaciones totales por año de fluopyram debe ser recomendado con la cantidad máxima de i.a./ha y por las directrices establecidas en FRAC para los fungicidas con el modo de acción SDHI. Independientemente de la formulación o el método de aplicación, no aplique más de 0.75 kg de ingrediente activo de fluopyram por hectárea por año, incluido el suelo y los usos foliares.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L