

Agromil·V[®]



BIOESTIMULANTE DE CRECIMIENTO

- Único bioestimulante con tecnología AV4G
- Compuestos hormonales de alta bioactividad
- Activa el crecimiento
- Reduce el estrés



Agroenzymas[®]

Soluciones que marcan tendencia 71

AGROMIL V: Activador fisiológico elaborado a base de auxinas, giberelinas, citocininas y vitaminas de alta bioactividad. Su objetivo es maximizar las funciones fisiológicas que se realizan a lo largo del ciclo de vida de los cultivos.

●●● GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Extractos de origen vegetal contiene las siguientes
fitohormonas y vitaminas biológicamente activas

% en peso
77,80

Citocininas	81,90 ppm	Riboflavina	0,86 ppb
Giberelinas	31,00 ppm	Nicotinamida	0,16 ppb
Auxinas	30,50 ppm	Colina	748,81 ppb
Ácido Fólico	0,92 ppb	Niacina	84,56 ppb
Ácido Pantoténico	12,53 ppb	Tiamina	100,11 ppb


Diluyentes y Acondicionadores

22,20
100,00

●●● TECNOLOGÍA



Es un proceso exclusivo de Agroenzimas® por medio del cual se extrae, separa y estandarizan los compuestos hormonales presentes en extractos vegetales. El resultado final de la tecnología 4G es la obtención de auxinas, citocininas y giberelinas en estado totalmente disponible lo que garantiza un efecto biológico superior.




INFORMACIÓN TÉCNICA



INGREDIENTE ACTIVO	Extracto de origen vegetal, de plantas y semillas terrestres.
GRUPO QUÍMICO	Extracto de origen vegetal terrestre.
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Extractos de origen vegetal 77.80 % Regulador de crecimiento
MODO DE ACCIÓN	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. Banda verde.
TOXICIDAD	LD50 Producto comercial Oral: > 16.000 mg/kg en Ratas Machos y >20.000 mg/kg en Ratas Hembras.
ANTÍDOTO	No tiene antídoto específico. Tratamiento base.
AUTORIZACIÓN COFEPRIS N°	No. RSCO-0139/VIII/95

••• MODO DE ACCIÓN

Para que se efectuó un proceso fisiológico se requiere una determinada cantidad de promotores del crecimiento (auxinas, giberelinas y citocininas); sin embargo, tanto las condiciones ambientales como el manejo cultural bajo el que se desarrolla un cultivo afecta la cantidad de estos, esta situación reduce la expresión de las respuestas fisiológicas y por consiguiente la productividad. Bajo este concepto las auxinas, giberelinas y citocininas contenidas en Agromil-V actúan restableciendo el déficit hormonal presente, situación que mejora los procesos de crecimiento y diferenciación celular; adicional el complejo vitamínico presente en el producto actúa como un agente catalizador de reacciones, efecto con el que se maximiza la respuesta biológica.



••• MOMENTOS DE APLICACIÓN


Todos los procesos de crecimiento y diferenciación se relacionan con la cantidad de auxinas, giberelinas y citocininas presentes en el tejido, de esta manera los momentos ideales para aplicación son durante crecimiento vegetativo, en fase reproductiva o bien en aquella etapa fenológica donde el impacto en los componentes del rendimiento es altamente significativo (por ejemplo floración). También es importante mencionar que cualquier tipo de estrés reduce la cantidad hormonal disponible en el tejido, por esta razón se recomienda que después de corregir este periodo limitativo se aplique Agromil-V.

••• MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación de Agromil-V puede ser realizada mediante cualquier método de aplicación aéreo o terrestre; lo más importante en cualquiera de los casos es tener un buen cubrimiento y utilizar la dosis señalada en la etiqueta.

••• COMPATIBILIDAD

Agromil-V es una formulación líquida, totalmente compatible con fertilizantes y plaguicidas de acción neutra, lo que permite optimizar el costo de su aplicación.



Rendimientos obtenidos en diferentes materiales de Maíz.



R E C O M E N D A C I O N E S

	CULTIVOS	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
	Ajo, brócoli, lechuga y cebolla	500 mL/ha por aplicación	1a. De 2 a 3 pares de hojas. 2a. De 1 a 2 semanas después.
	Alfalfa	500 mL/ha por aplicación	Aplicaciones mensuales, aplicando después del corte 3 días después del riego.
	Algodón	500 mL/ha por aplicación	1a. Al inicio del cuadreo. 2a. De 3 a 4 semanas después.
	Chile, tomate, garbanzo, frijol, pepino, calabaza y soya	500 mL/ha por aplicación	1a. Al inicio de la floración. 2a. De 3 a 4 semanas después.
	Fresa	500 mL/ha por aplicación	Aplicaciones mensuales desde el inicio de la floración.
	Mangos, cítricos y aguacates	1 mL/L de agua por aplicación	1a. Al inicio de la floración. 2a. Con frutillo tamaño canica.
	Manzana, pera, guayaba, durazno, ciruelo y nogal.	1 mL/L de agua por aplicación	Cuando existe del 30 al 50% de floración.
	Melón y sandía	500 - 1000 mL/ha	1a. Al inicio de la floración. 2a. De 3 a 4 semanas después.
	Ornamentales	1 mL/L de agua por aplicación	1a. De 10 a 20cm de altura. 2a. De 3 a 4 semanas después.
	Papa	500 mL/ha por aplicación	1a. Al inicio de la formación del tubérculo. 2a. De 3 a 4 semanas después.
	Piña	1 mL/L de agua por aplicación	1a. A la formación de la cabeza. 2a. De 3 a 4 semanas después.
	Plátano	1 mL/L de agua por aplicación	Aplicaciones mensuales
	Trigo, arroz, cebada y avena	500 - 750 mL/ha	Al amacollamiento
	Vídi	1 mL/L de agua por aplicación	Cuando el brote tenga 10 cm de longitud.
	Caña y maíz	1000 mL/ha	De 6-8 hojas.

Recomendamos aplicar en mezcla con Agrex F coadyuvante que mejora la dispersión y penetración de la solución al tejido.

Soluciones que marcan tendencia ↗



Agroenzymas®

Vía Dr. Gustavo Baz 176-3, Col. San Jerónimo Tepetlaco
Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54090

Tel. +52 (55) 53.66.70.50 Fax. +52 (55) 53.66.70.70

www.agroenzymas.com