

1. FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

ESPAÑA

Fabricado en España



2. RIQUEZAS GARANTIZADAS.

Riquezas Garantizadas	%p/p ¹	% p/v
Nitrógeno total (N)	7,20	8,06
Nitrógeno orgánico	2,00	2,24
Nitrógeno ureico	5,10	5,71
Nitrógeno amoniacal	0,10	0,11
Aminoácidos libres	9,00	10,08

3. NOMBRE COMERCIAL

codasting

ABONO CON AMINOÁCIDOS

4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	Solución oscura
Estado físico	Líquido
Color	Marrón
CE (1%) (mS/cm)	--
Densidad (Kg/L)	1,12 ± 0,01
pH	5,5 ± 0,5
Solubilidad	Totalmente soluble en agua

¹ Contenidos garantizados con las tolerancias establecidas en el Anexo III del RD 506/2013

5. PROPIEDADES.

codasting es un abono especial de aplicación foliar o radicular con gran poder de penetración y rápido efecto. La sinergia entre el nitrógeno, los aminoácidos de origen vegetal y los coadyuvantes especiales potencian sus efectos sobre la planta, entre los que cabe destacar:

- Aumento de la masa radicular y del crecimiento vegetativo.
- Adelanto de la floración.
- Aumento de la calidad del fruto (peso, color y contenido en azúcar).
- Aumento de la resistencia a condiciones de stress (escasez de agua, cambios bruscos de temperatura...).

6. MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS

codasting es un producto líquido completamente soluble en agua recomendado en todo tipo de cultivos. **codasting** puede usarse en aplicación foliar o radicular.

Las dosis recomendadas son:

APLICACIÓN EN FERTIRRIGACIÓN		
Dosis	Nº Aplicaciones	Observaciones
1 – 2 l/ha	3 – 4 (a intervalos de 20 días)	1ª aplicación: Inicio floración 2ª aplicación: Cuajado 3ª aplicación: Desarrollo fruto

APLICACIÓN FOLIAR			
Cultivos	Dosis	Nº Aplicaciones	Observaciones
HORTÍCOLAS Tomate, Pimiento, Melón, Berenjena, Calabacín,...	100 – 150 cc/HI	2 – 4	1ª aplicación: en prefloración o en estadio de 4-6 hojas. Resto: a intervalos de 15-20 días.
FRUTALES Peral, Manzano, Melocotonero, Cerezo...	100 cc/HI	2 – 3	1ª aplicación: Caída de pétalos. Resto: a intervalos de 15-20 días.
CÍTRICOS Naranja, Mandarino etc.	100 cc/HI	2 – 3	1ª aplicación: Pre-brotación de primavera. 2ª aplicación: Caída de pétalos. 3ª aplicación: Crecimiento del fruto.
FRESÓN	100 cc/HI	3 – 4	1ª aplicación: Prefloración. Resto a intervalos de 20 días.
PATATAS	100 cc/HI	3	1ª aplicación: Estadio de 4-6 hojas. Resto: A intervalos de 20 días.
GUISANTE, GARBANZO	100 cc/HI	3	1ª aplicación: Estadio de 4-6 hojas. Resto: A intervalos de 20 días.
VIÑA	75 - 100 cc/HI	2	1ª aplicación: Pre-floración. 2ª aplicación: Post-floración.
NÍSPERO	100 cc/HI	3	1ª aplicación: Pre-floración. 2ª aplicación: Post-floración.

APLICACIÓN FOLIAR			
			3ª aplicación: Cerca de maduración.
AGUACATE, CHIRIMOYO	100 cc/Hl	2	1ª aplicación: Pre-floración. 2ª aplicación: Post-floración.
OLIVO	75 - 100 cc/Hl	2	1ª aplicación: Inicio de floración. 2ª aplicación: Final del cuaje.
ALGODÓN, GIRASOL	1 l/ha	2	1ª aplicación: Pre-floración. 2ª aplicación: Al cabo de 20-30 días.
REMOLACHA	1 l/ha	1	Cuando la planta tiene 6-10 hojas.

En invernadero se recomienda usar las dosis más altas.

7. OBSERVACIONES

codasting es miscible con los agroquímicos normalmente empleados, con la única excepción de los que poseen reacción alcalina. De todas maneras se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

Las recomendaciones facilitadas son de carácter general, siendo aconsejable su aplicación bajo asesoramiento agronómico.

Temperatura óptima de almacenamiento de 5-30º C.

No apilar más de 5 cajas de altura.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.



Tecnología agro sostenible creada por SAS

* Copia no controlada